

### 문항카드 3. 논술전형 자연계열 수학 1번

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) / 1번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	확률과 통계
	핵심개념 및 용어	이산확률변수, 기댓값
예상 소요 시간	10분 / 전체 90분	

2. 문항 및 제시문	
<p>[문제 1] 한 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 <math>a</math>라 하자. <math>x</math>축, <math>y</math>축 및 직선 <math>x + y = a</math>로 둘러싸인 직각이등변삼각형에 대하여 다음 물음에 답하시오.</p>	
<p>[문제 1-1] 직각이등변삼각형의 빗변 위의 점들 중 <math>x</math>좌표와 <math>y</math>좌표가 모두 음이 아닌 정수인 점들의 개수를 확률변수 <math>X</math>라 할 때, <math>E(X)</math>의 값을 구하시오. [4점]</p>	
<p>[문제 1-2] 직각이등변삼각형의 둘레 또는 내부에 있는 점들 중 <math>x</math>좌표와 <math>y</math>좌표가 모두 음이 아닌 정수인 점들의 개수를 확률변수 <math>Y</math>라 할 때, <math>E(Y)</math>의 값을 구하시오. [4점]</p>	

3. 출제 의도	
<p>고등학교 교육과정에서 중요하게 다루는 「확률과 통계」 과목에서 문제를 출제하였다. 구체적으로 기댓값에 관한 기본적인 개념 및 원리를 묻는 문제를 출제하였다. 고등학교 수학과에서 다루는 중요한 개념의 확실한 이해를 바탕으로 제시된 조건과 상황을 정확히 분석하여 논리적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 발휘할 수 있는지를 평가한다.</p>	

#### 4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	<p><b>확률과 통계</b> [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.</p>

나) 자료출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	확률과 통계	김원경 외	비상	2019	73-80
	확률과 통계	홍성복 외	지학사	2019	83-91
	확률과 통계	황선욱 외	미래엔	2019	79-82, 86-88

## 5. 문항 해설

[문제 1-1] 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를  $a$ 라 할 때, 빗변 위의 점들 중  $x, y$ 좌표가 모두 음이 아닌 정수인 점들의 개수는  $a+1$ 이다. 따라서 확률변수  $X$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

$X$	2	3	4	5	6	7
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

따라서  $E(X)$ 는  $\frac{9}{2}$  이다.

## [문제 1-2]

주사위를 던져서 나오는 눈의 수를  $a$ 라 할 때, 둘레 또는 내부에 있는 점 중  $x, y$ 좌표가 모두 음이 아닌 정수인 점들의 개수는  $\frac{(a+1)(a+2)}{2}$ 이다. 따라서 확률변수  $Y$ 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

$Y$	3	6	10	15	21	28
$P(Y=y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

따라서  $E(Y)$ 는  $\frac{83}{6}$  이다.


### 문항카드 4. 논술전형 자연계열 수학 2번

1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) / 2번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I, 수학 II, 미적분, 기하
	핵심개념 및 용어	로그함수, 사잇값 정리, 수열의 극한, $e$ , 쌍곡선
예상 소요 시간	25분 / 전체 90분	

### 2. 문항 및 제시문

[문제 2] <그림 1>과 같이 모든 항이 양수인 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여 쌍곡선  $\frac{x^2}{(a_{n+1})^2} - y^2 = 1 \ (x \geq a_{n+1})$  과 함수  $y = \ln(1+x)$ 의 그래프는 한 점에서 만난다. 이 점의  $x$ 좌표를  $b_n$ 이라 할 때, 아래 제시문을 참고하여 다음 물음에 답하시오.

제시문 1.  $x > 0$ 인 실수  $x$ 에 대하여  $\ln(1+x) < x$ 가 성립한다.  
 제시문 2. 자연수  $n$ 에 대하여  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$  이 성립한다.



<그림 1>

[문제 2-1] 수열  $\{a_n\}$ 이  $1 + \frac{1}{(a_n)^2} \leq \frac{1}{(a_{n+1})^2}$ 을 만족시킬 때,  $a_{n+1} < b_n < a_n$ 이 성립함을 보이시오.

[10점]

[문제 2-2]  $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\frac{n}{2}}$ 일 때,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln(1+b_n)$ 의 값을 구하시오. [7점]

### 3. 출제 의도

고등학교 교육과정에서 중요하게 다루는 「수학 I」, 「수학 II」, 「미적분」, 「기하」 과목에서 문제를 출제하였다. 구체적으로 수열, 연속함수의 성질, 로그함수, 쌍곡선에 관한 기본적인 개념 및 원리를 묻는 문제를 출제하였다. 고등학교 수학과에서 다루는 중요한 개념의 확실한 이해를 바탕으로 제시된 조건과 상황을 정확히 분석하여 논리적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 발휘할 수 있는지를 평가한다.

### 4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	<b>수학 I</b> [12수학 I 01-07] 지수함수와 로그함수의 그래프를 그릴 수 있고, 그 성질을 이해한다.
	<b>수학 II</b> [12수학 II 01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.
	<b>미적분</b> [12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 활용하여 극한값을 구할 수 있다.
	<b>기하</b> [12기하01-03] 쌍곡선의 뜻을 알고, 쌍곡선의 방정식을 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	홍성복 외	지학사	2019	43-49
	수학 I	배종숙 외	금성출판사	2019	46-49
	수학 II	고성은 외	좋은책신사고	2019	38-39
	수학 II	황선욱 외	미래엔	2019	38-39
	미적분	황선욱 외	미래엔	2019	16-20, 56-58
	미적분	이준열 외	천재교육	2019	17-20
	기하	황선욱 외	미래엔	2019	42-47
	기하	홍성복 외	지학사	2019	22-28

### 5. 문항 해설

[문제 2-1] 가정에 의해 수열  $\{a_n\}$ 이  $\frac{1}{(a_n)^2} < 1 + \frac{1}{(a_n)^2} \leq \frac{1}{(a_{n+1})^2}$  이므로  $a_n > a_{n+1}$ 이다.

$f(x) = \ln(1+x) - \frac{1}{a_{n+1}}\sqrt{x^2 - (a_{n+1})^2}$  이라 하면  $f(a_{n+1}) = \ln(1+a_{n+1}) > 0$ 이고,

제시문 1에 의해

$$f(a_n) = \ln(1+a_n) - \frac{1}{a_{n+1}}\sqrt{(a_n)^2 - (a_{n+1})^2} < a_n - \sqrt{\frac{(a_n)^2}{(a_{n+1})^2} - 1} \leq 0 \quad \left( \because 1 + \frac{1}{(a_n)^2} \leq \frac{1}{(a_{n+1})^2} \right)$$

함수  $f(x)$ 는 닫힌 구간  $[a_{n+1}, a_n]$ 에서 연속이고  $f(a_n) < 0 < f(a_{n+1})$ 이므로 사잇값 정리와 <그림 1>에 의하여  $f(x) = 0$ 의 한 개의 근  $b_n$ 이 열린 구간  $(a_{n+1}, a_n)$ 에 존재한다.

따라서  $a_{n+1} < b_n < a_n$  이다.

[문제 2-2] 제시문 2에 의해

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{(a_n)^2} &= 1 + n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 1 + n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= 1 + (n+1) \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} - \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \\ &= 1 + \frac{1}{(a_{n+1})^2} - \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < \frac{1}{(a_{n+1})^2} \end{aligned}$$

이므로 수열  $\{a_n\}$ 은 [문제 2-1]의 조건을 만족한다. 따라서 [문제 2-1]에 의해  $a_{n+1} < b_n < a_n$ 이다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\frac{n}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ 이므로 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} a_n = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ 이고}$$

수열의 극한의 성질에 의해  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} b_n = \frac{1}{\sqrt{e}}$  이다.

$$\text{따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \ln(1 + b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} b_n \times \frac{\ln(1 + b_n)}{b_n} = \frac{1}{\sqrt{e}} \text{ (단, } e \text{는 자연상수) 이다.}$$

## 문항카드 5. 논술전형 자연계열 수학 3번

### 1. 일반 정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) / 3번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학 I
	핵심개념 및 용어	등차수열, $\sum_{k=1}^n a_k$
예상 소요 시간	30분 / 전체 90분	

### 2. 문항 및 제시문

[문제 3] 자연수  $N$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 홀수  $m$ 의 값의 합을  $f(N)$ 이라 하자.

(가) 등차수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이 자연수이고 공차가 1이다.

(나1)  $\sum_{k=1}^m a_k = N$ 이다.

예를 들어,  $N=21$ 인 경우에 아래의 두 가지만 가능하므로  $f(21) = 1 + 3 = 4$ 이다.

$$21 = 21 = \sum_{k=1}^1 (20+k), \quad 21 = 6+7+8 = \sum_{k=1}^3 (5+k)$$

자연수  $N$ 과 홀수  $m$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 수열  $\{a_n\}$ 의 첫째항이 될 수 있는 자연수의 개수를  $g_N(m)$ 이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(가) 등차수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이 자연수이고 공차가 1이다.

(나2)  $\sum_{k=1}^m a_k \leq N$ 이다.

[문제3-1]  $N$ 을  $m$ 으로 나눈 나머지가  $r$ 일 때,  $g_N(m)$ 을  $N, m, r$ 를 이용하여 나타내시오. [7점]

[문제3-2]  $\sum_{N=1}^{200} f(N)$ 의 값을 구하시오. [10점]

### 3. 출제 의도

고등학교 교육과정에서 중요하게 다루는 「수학 I」 과목에서 문제를 출제하였다. 구체적으로 등차수열과 수열의 합에 관한 기본적인 개념 및 원리를 묻는 문제를 출제하였다. 고등학교 수학과에서 다루는 중요한 개념의 확실한 이해를 바탕으로 제시된 조건과 상황을 정확히 분석하여 논리적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 발휘할 수 있는지를 평가한다.

**4. 출제 근거**

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	<p><b>수학 I</b></p> <p>[12수학 I 03-02] 등차수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제<math>n</math>항까지의 합을 구할 수 있다.</p> <p>[12수학 I 03-04] <math>\sum</math>의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.</p> <p>[12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제<math>n</math>항까지의 합을 구할 수 있다.</p>

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 I	고성은 외	좋은책신사고	2019	115-118, 133-138
	수학 I	김원경 외	비상	2019	119-122, 139-144
	수학 I	황선욱 외	미래엔	2019	123-126, 143-149

**5. 문항 해설**

[문제 3-1] 첫째항이  $a$ 이고 공차가 1인 수열  $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^m a_k = \sum_{k=1}^m (a + k - 1) = am + \frac{m(m-1)}{2}$$

이고, 이 합이  $N$ 보다 작거나 같아야 하므로  $am + \frac{m(m-1)}{2} \leq N$ 이다.

따라서  $a \leq \frac{N}{m} - \frac{m-1}{2}$ 을 만족시켜야 하고,  $a$ 는  $\frac{N}{m} - \frac{m-1}{2}$ 보다 작거나 같은 자연수가 될 수 있다.

$N$ 을  $m$ 으로 나눈 나머지는  $r$ 이고  $m$ 은 홀수이므로,  $\frac{N}{m} - \frac{m-1}{2}$ 보다 작거나 같은 최대의 자연수는  $\frac{N-r}{m} - \frac{m-1}{2}$ 이다.

따라서  $g_N(m) = \frac{N-r}{m} - \frac{m-1}{2}$ 이다.

[문제 3-2] 1부터 홀수  $m$ 까지의 자연수의 합이 200이하가 되려면

$$1 + 2 + \dots + m = \frac{m(m+1)}{2} \leq 200$$

이므로  $m \leq 19$ 이다. 따라서  $\sum_{N=1}^{200} f(N)$ 은 19 이하인 홀수  $m$ 에 대해 각각  $g_{200}(m)$ 을 구하여  $m \times g_{200}(m)$ 을 모두 더한 값과 같으므로

$$\sum_{N=1}^{200} f(N) = \sum_{k=1}^{10} \{(2k-1) \times g_{200}(2k-1)\}$$

200을  $m$ 으로 나눈 나머지를  $r_m$ 이라 두면

$$\sum_{k=1}^{10} \{(2k-1) \times g_{200}(2k-1)\} = \sum_{k=1}^{10} \{200 - r_{2k-1} - (k-1)(2k-1)\} = 1990 - \sum_{k=1}^{10} r_{2k-1} - 2 \sum_{k=1}^{10} k^2 + 3 \sum_{k=1}^{10} k$$

200을 19 이하의 홀수로 나눈 나머지는 아래 표와 같고, 이들의 합은 43이다.

$m$	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
$r_m$	0	2	0	4	2	2	5	5	13	10

따라서  $\sum_{k=1}^{10} (2k-1) \times g_{200}(2k-1) = 1990 - \frac{10 \times 11 \times 21}{3} + 3 \times 55 - 43 = 1342$  이다.

### 문항카드 6. 논술전형 자연계열 수학 4번


1. 일반 정보		
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	수시모집 논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열(수학) / 4번	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	기하
	핵심개념 및 용어	영벡터, 실수배, 평면벡터, 벡터의 성분
예상 소요 시간	25분 / 전체 90분	

### 2. 문항 및 제시문

[문제 4] 세 점  $O(0, 0)$ ,  $A(2022, 0)$ ,  $B(0, 2022)$ 를 꼭짓점으로 하는 직각이등변삼각형  $OAB$ 의 내부 및 둘레에 다음 조건을 만족하도록 여러 개의 선분을 그어 그 선분을 변으로 하는 유한 개의 다각형을 만든다고 할 때, 다음 물음에 답하십시오. (단, 양 끝점 중 적어도 한 개의 점이 삼각형  $OAB$ 의 내부에 있는 선분은 두 다각형의 변이 되고, 두 끝점이 모두 삼각형  $OAB$ 의 둘레에 있는 선분은 오직 한 다각형의 변이 된다.)

- (가) 다각형의 모든 변은  $x$ 축,  $y$ 축, 직선  $y = x$ , 직선  $y = -x$  중 하나와 평행하다.
- (나) 다각형의 모든 내각의 크기는  $180^\circ$  보다 작다.
- (다) 다각형의 변과 삼각형  $OAB$ 의 변이 한 점에서 만날 때, 두 선분은 서로 수직이다.
- (라) 다각형의 꼭짓점이 삼각형  $OAB$ 의 내부에 있을 때, 이 꼭짓점은 서로 다른 세 선분의 끝점이고 세 선분 중 두 개는 좌표축과 평행하다.

[문제 4-1] <그림 2>와 같이 다각형의 꼭짓점  $V$ 가 삼각형  $OAB$ 의 내부에 있을 때, 점  $V$ 에서 점  $V$ 와 선분으로 연결된 세 점으로 향하는 벡터와 방향이 같은 세 개의 벡터  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 가 있다. 가능한 모든 세 개의 벡터에 대하여  $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = \vec{0}$ 임을 보이시오. (단, 세 벡터  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 의 성분은  $-1$  또는  $0$  또는  $1$ 이다.) [5점]



<그림 2>

**[문제 4-2]** 다각형의 꼭짓점 P가 삼각형 OAB의 둘레에 있고 점 P와 선분으로 연결된 점 Q가 삼각형 OAB의 내부에 있을 때, 벡터  $\vec{QP}$ 와 방향이 같은 벡터  $\vec{u}$ 를 점 P에 대한 **경계벡터**라 하자. 모든 경계벡터의 합이  $\vec{0}$ 임을 보이시오. (단, 경계벡터  $\vec{u}$ 의 성분은  $-1$  또는  $0$  또는  $1$ 이다.) **[7점]**

**[문제 4-3]** 선분 OA, 선분 OB, 선분 AB와 각각 만나는 다각형의 개수가 모두 같음을 보이시오. (예를 들어, <그림 2>에서 선분 OA, 선분 OB, 선분 AB와 각각 만나는 다각형의 개수는 모두 5이다.) **[6점]**

**3. 출제 의도**

고등학교 교육과정에서 중요하게 다루는 「기하」 과목에서 문제를 출제하였다. 구체적으로 평면벡터에 관한 기본적인 개념 및 원리를 묻는 문제를 출제하였다. 고등학교 수학과에서 다루는 중요한 개념의 확실한 이해를 바탕으로 제시된 조건과 상황을 정확히 분석하여 논리적 사고력과 창의적 문제 해결 능력을 발휘할 수 있는지를 평가한다.

**4. 출제 근거**

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준


적용 교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 8] “수학과 교육과정”
문항 및 제시문	학습내용 성취 기준
성취기준	<p><b>기하</b>                      [12기하02-02] 벡터의 덧셈, 뺄셈, 실수배를 할 수 있다.                      [12기하02-03] 위치벡터의 뜻을 알고, 평면벡터와 좌표의 대응을 이해한다.</p>

나) 자료출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	기하	김원경 외	비상	2019	55-66, 73-80
	기하	황선욱 외	미래엔	2019	69-81, 87-95
	기하	홍성복 외	지학사	2019	59-72, 79-88

**5. 문항 해설**


**[문제 4-1]** 다각형의 변이  $x$ 축,  $y$ 축, 직선  $y = x$ , 또는 직선  $y = -x$ 와 평행하므로, 꼭짓점 V에서 만나는 세 선분이 서로 이룰 수 있는 각 중  $180^\circ$  보다 작은 각은  $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$  중 하나이다. 조건 (라)에 의하여 두 개의 선분이 좌표축과 평행하므로 남은 하나의 선분은 직선  $y = x$  또는 직선  $y = -x$ 와 평행해야 한다. 따라서, 꼭짓점 V에서 점 V와 선분으로 연결된 세 점으로 향하는 벡터 방향의 조합은 아래 그림과 같다.



각각의 경우 성분이  $0, 1, -1$  중 하나로 이루어진 벡터들의 집합  $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ 는  $\{(-1, -1), (1, 0), (0, 1)\}, \{(1, -1), (0, 1), (-1, 0)\}, \{(1, 1), (-1, 0), (0, -1)\}, \{(-1, 1), (0, -1), (1, 0)\}$ 이다.

따라서 네 가지 경우 모두  $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = \vec{0}$  이다.

**[문제 4-2]** 삼각형 OAB의 내부에 있는 모든 꼭짓점 V에서 [문제 4-1]에서의 세 벡터  $\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3$ 를 중복을 허락하여 모아서 이들을 더하여 얻은 벡터를  $\vec{u}_{total}$ 이라 하자. 이때, 각 V에 대해  $\vec{u}_1 + \vec{u}_2 + \vec{u}_3 = \vec{0}$  이므로,  $\vec{u}_{total} = \vec{0}$ 이다.



삼각형 OAB의 둘레와 만나지 않는 선분의 양 끝점 V, W를 생각해보자.

그림에 의해 위에 모은 벡터 중 V에서 W로, W에서 V로 향하는 두 벡터의 합은  $\vec{0}$ 이다. 이렇게 삼각형 OAB의 둘레와 만나지 않는 모든 선분을 고려하면,  $\vec{u}_{total}$ 의 값은 모든 경계벡터의 합과 같다.

따라서 모든 경계벡터의 합은  $\vec{0}$ 이다.

**[문제 4-3]** 조건 (다)에 의해 경계벡터는 삼각형 OAB의 한 변에 수직이므로 선분 OA에 수직인 경계벡터는  $(0, -1)$ , 선분 OB에 수직인 경계벡터는  $(-1, 0)$ , 선분 AB에 수직인 경계벡터는  $(1, 1)$ 이다.

이들의 개수를 각각  $l, m, n$ 이라 하면,

$$\vec{u}_{total} = l(0, -1) + m(-1, 0) + n(1, 1) = (n - m, n - l) = \vec{0} \text{ 이므로 } l = m = n \text{ 이다.}$$

선분 OA, 선분 OB, 선분 AB와 각각 만나는 다각형의 개수는  $l + 1, m + 1, n + 1$ 이므로, 다각형의 개수가 모두 같다.