

문항카드(수리계열 - 수학)

[문제 1]

1. 일반 정보

| | | |
|-----------------------|---|---|
| 유형 | <input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 | |
| 전형명 | 논술(AAT) 전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호 | 자연계열1 / [1-1]~[1-3] | |
| 출제 범위 | 수학과 교육과정 과목명 | 확률과 통계, 미적분Ⅱ |
| | 핵심 개념 및 용어 | 연속확률변수, 확률밀도함수, 확률, 치환적분법, 부분적분법, 삼각함수의 정적분 |
| 예상 소요 시간 | 전체 시험시간 100분 중 25분 | |

2. 문항 및 제시문

(가) 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 미분가능한 함수 $x=g(t)$ 의 도함수 $g'(t)$ 가 닫힌 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 연속이고 $a=g(\alpha)$, $b=g(\beta)$ 이면

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt$$

이다.

(나) 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f'(x), g'(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \left[f(x)g(x) \right]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx$$

이다.

연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} a \left| x - \frac{\pi}{2} \right| & (-\pi \leq x \leq \pi) \\ 0 & (x < -\pi, x > \pi) \end{cases}$$

일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a 는 상수이다.)

【1-1】 상수 a 의 값을 구하시오. (30점)

【1-2】 확률 $P\left(\left|X - \frac{\pi}{2}\right| \leq \pi\right)$ 를 구하시오. (20점)

【1-3】 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \int_{-n\pi}^{n\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \cos x dx$$

일 때, $\frac{b_2}{b_5}$ 의 값을 구하시오. (50점)

3. 출제 의도

【1-1】 확률밀도함수의 성질을 적용할 수 있는지를 평가한다.

【1-2】 연속확률변수의 확률을 구할 수 있는지를 평가한다.

【1-3】 치환적분법과 부분적분법을 활용하여 삼각함수를 적분할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 | | 관련 성취기준 |
|-------------|-----------|--|
| 제시문 (가) | 교육과정 | [미적분Ⅱ]-(다) 적분법-㉑ 여러 가지 적분법 ① 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 Ⅱ]-(3) 적분법-(가) 여러 가지 적분법 미적2411. 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. |
| 제시문 (나) | 교육과정 | [미적분Ⅱ]-(다) 적분법-㉑ 여러 가지 적분법 ② 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 Ⅱ]-(3) 적분법-(가) 여러 가지 적분법 미적2412. 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. |
| 문항 [1-1] | 교육과정 | [확률과 통계]-(다) 통계-㉑ 확률분포 ① 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다. |
| | 성취기준·성취수준 | [확률과 통계]-(3) 통계-(가) 확률분포 확통1311-2. 연속확률변수와 확률밀도함수의 뜻을 안다. |
| 문항 [1-2] | 교육과정 | [확률과 통계]-(다) 통계-㉑ 확률분포 ① 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다. |
| | 성취기준·성취수준 | [확률과 통계]-(3) 통계-(가) 확률분포 확통1311-2. 연속확률변수와 확률밀도함수의 뜻을 안다. |
| 문항 [1-3] | 교육과정 | [미적분Ⅱ]-(다) 적분법-㉑ 여러 가지 적분법 ① 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. ② 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. ③ 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 Ⅱ]-(3) 적분법-(가) 여러 가지 적분법 미적2411. 치환적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 미적2412. 부분적분법을 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 미적2413-2. 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다. |

※ 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책 8] “수학과 교육과정” 및 교육과학기술부 발간 “2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준: 고등학교 수학”(교육과학기술부 발간등록번호 11-1341000-002322-01)에 근거

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행 연도 | 쪽수 |
|-------------------|--------|-------|------------|-------|---------------------|
| 고등학교 교과서 기타 | 확률과 통계 | 김원경 외 | 비상교육 | 2017 | 104-108 |
| | 확률과 통계 | 정상권 외 | 금성출판사 | 2017 | 140-141 |
| | 확률과 통계 | 황선욱 외 | 좋은책 신사고 | 2017 | 113-114 |
| | 미적분 II | 이준열 외 | 천재교육 | 2016 | 172-174, 176-185 |
| | 미적분 II | 신항균 외 | 지학사 | 2016 | 155-156, 157-163 |
| | 미적분 II | 우정호 외 | 동아출판 | 2016 | 109-111, 183-192 |

5. 문항 해설

- [1-1]** 확률밀도함수의 성질을 이용하여 확률밀도함수가 되기 위한 상수를 구하도록 함.
[1-2] [1-1]에서 구한 상수를 이용하여 주어진 조건을 만족하는 연속확률변수의 확률을 구하도록 함.
[1-3] [1-1]에서 구한 상수를 바탕으로 (가)와 (나)에 제시된 치환적분법과 부분적분법을 적용하여 삼각함수의 정적분을 하고 조건을 만족하는 값을 구하도록 함.

6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|--------------|--|----|
| [1-1] | $P(-\pi \leq X \leq \pi) = 1$ 에 대한 언급: 10점 (※ 직접적인 언급은 없지만 이후 확률이 1임을 이용하여 상수를 구한 경우는 언급한 것으로 간주함.) $P\left(-\pi \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{2}\pi \times \frac{3}{2}\pi a \times \frac{1}{2}$: 5점 $P\left(\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right) = \frac{1}{2}\pi \times \frac{1}{2}\pi a \times \frac{1}{2}$: 5점 (※ $\int_{-\pi}^{\pi} \left x - \frac{\pi}{2}\right dx = a \left[\frac{\pi}{2}x - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + a \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi}{2}x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}$: 10점) $a = \frac{4}{5\pi^2}$: 10점 | 30 |
| [1-2] | $P\left(\left X - \frac{\pi}{2}\right \leq \pi\right) = P\left(-\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right)$: 10점 (※ $P\left(\left X - \frac{\pi}{2}\right \leq \pi\right) = \frac{4}{5\pi^2} \left\{ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) dx \right\}$ 와 같이 $\left(-\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right)$ 이외의 구간에서는 0임을 아는 경우: 10점) $P\left(\left X - \frac{\pi}{2}\right \leq \pi\right) = \frac{1}{2}$: 10점 | 20 |

1단계) $b_n = n \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt$: 10점

(※ $b_2 = 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos 2tdt$ (또는 $b_5 = 5 \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos 5tdt$)를 쓴 경우도 10점)

2단계) $b_n = \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{n} \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \sin nt \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin ntdt \right.$
 $\left. + \left[\frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \sin nt \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin ntdt \right\}$: 10점

(또는 $b_n = \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{t}{n} \sin nt \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin ntdt - \frac{\pi}{2n} [\sin nt]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right.$
 $\left. - \left[\frac{t}{n} \sin nt \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin ntdt + \frac{\pi}{2n} [\sin nt]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \right\}$: 10점)

(또는 $b_2 = \frac{8}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{2} \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 2tdt \right.$
 $\left. + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \sin 2t \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin 2tdt \right\}$: 10점)

【1-3】

(또는 $b_5 = \frac{4}{\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{5} \left(t - \frac{\pi}{2} \right) \sin 5t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 5tdt \right.$
 $\left. + \left[\frac{1}{5} \left(\frac{\pi}{2} - t \right) \sin 5t \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{5} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin 5tdt \right\}$: 10점)

(※ $b_n = n \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt$ 없이 쓴 경우 : 20점)

3단계) $b_n = \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ \frac{2}{n^2} \cos n\pi - \frac{2}{n^2} \cos \frac{n}{2}\pi \right\}$ (또는 $= \frac{8}{5\pi^2 n} \left(\cos n\pi - \cos \frac{n}{2}\pi \right)$)

$b_2 = \frac{8}{5\pi^2}$: 10점

$b_5 = -\frac{8}{25\pi^2}$: 10점

※ [1~3단계 통합]

b_2 를 직접 옳게 구한 경우 : 20점(중간 단계: 10점, 별해 3) 참조)

b_5 를 직접 옳게 구한 경우 : 20점(중간 단계: 10점, 별해 3) 참조)

4단계) $\frac{b_2}{b_5} = -5$: 10점

(※ -5를 구하는 과정이 틀린 경우는 틀린 것으로 간주함.)

7. 예시 답안

【1-1】

$$P(-\pi \leq X \leq \pi) = P\left(-\pi \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) + P\left(\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right)$$

$$\begin{aligned} P\left(-\pi \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) &= \frac{3}{2}\pi \times \frac{3}{2}\pi a \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{9}{8}\pi^2 a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\left(\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right) &= \frac{1}{2}\pi \times \frac{1}{2}\pi a \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{8}\pi^2 a \end{aligned}$$

따라서 $P(-\pi \leq X \leq \pi) = \frac{9}{8}\pi^2 a + \frac{1}{8}\pi^2 a = 1$ 이므로

$$a = \frac{4}{5\pi^2} \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{별해)} \int_{-\pi}^{\pi} a \left| x - \frac{\pi}{2} \right| dx &= a \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx + a \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) dx \\ &= a \left[\frac{\pi}{2}x - \frac{1}{2}x^2 \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + a \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{\pi}{2}x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \\ &= \frac{9}{8}\pi^2 a + \frac{1}{8}\pi^2 a \end{aligned}$$

따라서 $P(-\pi \leq X \leq \pi) = \frac{9}{8}\pi^2 a + \frac{1}{8}\pi^2 a = 1$ 이므로

$$a = \frac{4}{5\pi^2} \text{ 이다.}$$

【1-2】

$$\begin{aligned} P\left(\left| X - \frac{\pi}{2} \right| \leq \pi\right) &= P\left(-\frac{\pi}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\pi\right) \\ &= P\left(-\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right) \\ &= P\left(-\frac{\pi}{2} \leq X \leq \frac{\pi}{2}\right) + P\left(\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right) \\ &= \frac{2}{5} + \frac{1}{10} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $P\left(\left| X - \frac{\pi}{2} \right| \leq \pi\right) = \frac{1}{2}$ 이다.

$$\begin{aligned} \text{별해)} P\left(\left| X - \frac{\pi}{2} \right| \leq \pi\right) &= \int_{-\pi}^{\pi} a \left| x - \frac{\pi}{2} \right| dx \\ &= \frac{4}{5\pi^2} \left\{ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) dx \right\} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

[1-3]

$$\begin{aligned}
 b_n &= \int_{-n\pi}^{n\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \cos x dx \\
 &= n \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos ntdt - \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos ntdt \right] \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{n} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin nt \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin ntdt \right. \\
 &\quad \left. + \left[\frac{1}{n} \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin nt \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin ntdt \right\} \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left(\frac{2}{n^2} \cos n\pi - \frac{2}{n^2} \cos \frac{n}{2}\pi \right) \\
 &= \frac{8}{5\pi^2 n} \left(\cos n\pi - \cos \frac{n}{2}\pi \right)
 \end{aligned}$$

따라서 $b_2 = \frac{8}{5\pi^2}$, $b_5 = -\frac{8}{25\pi^2}$ 이므로,

$$\frac{b_2}{b_5} = -5 \text{ 이다.}$$

별해 1) $b_n = \int_{-n\pi}^{n\pi} f\left(\frac{x}{n}\right) \cos x dx$

$$\begin{aligned}
 &= n \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos ntdt - \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos ntdt \right] \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} t \cos ntdt - \frac{\pi}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos ntdt - \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} t \cos ntdt + \frac{\pi}{2} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \cos ntdt \right] \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{t}{n} \sin nt \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin ntdt - \frac{\pi}{2n} [\sin nt]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \right. \\
 &\quad \left. - \left[\frac{t}{n} \sin nt \right]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin ntdt + \frac{\pi}{2n} [\sin nt]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \right\} \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left\{ -\frac{\pi}{2n} \sin \frac{n}{2}\pi + \frac{1}{n^2} [\cos nt]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} + \frac{\pi}{2n} \sin \frac{n}{2}\pi \right. \\
 &\quad \left. - \frac{\pi}{2n} \sin \frac{n}{2}\pi - \frac{1}{n^2} [\cos nt]_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} + \frac{\pi}{2n} \sin \frac{n}{2}\pi \right\} \\
 &= \frac{4n}{5\pi^2} \left(\frac{2}{n^2} \cos n\pi - \frac{2}{n^2} \cos \frac{n}{2}\pi \right) \\
 &= \frac{8}{5\pi^2 n} \left(\cos n\pi - \cos \frac{n}{2}\pi \right)
 \end{aligned}$$

따라서 $b_2 = \frac{8}{5\pi^2}$, $b_5 = -\frac{8}{25\pi^2}$ 이므로, $\frac{b_2}{b_5} = -5$ 이다.

$$\begin{aligned}
\text{별해 2)} \quad b_2 &= \int_{-2\pi}^{2\pi} f\left(\frac{x}{2}\right) \cos x dx = 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos 2t dt \\
&= \frac{8}{5\pi^2} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos 2t dt - \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos 2t dt \right] \\
&= \frac{8}{5\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{2} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin 2t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 2t dt \right. \\
&\quad \left. + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin 2t \right]_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \sin 2t dt \right\} \\
&= \frac{8}{5\pi^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_5 &= \int_{-5\pi}^{5\pi} f\left(\frac{x}{5}\right) \cos x dx = 5 \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos 5t dt \\
&= \frac{4}{\pi^2} \left[\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos 5t dt - \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \cos 5t dt \right] \\
&= \frac{4}{\pi^2} \left\{ \left[\frac{1}{5} \left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin 5t \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{5} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin 5t dt \right. \\
&\quad \left. + \left[\frac{1}{5} \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin 5t \right]_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{5} \int_{-\pi}^{-\frac{\pi}{2}} \sin 5t dt \right\} \\
&= -\frac{8}{25\pi^2} \quad \text{따라서} \quad \frac{b_2}{b_5} = -5 \text{이다.}
\end{aligned}$$

별해 3)

$$\begin{aligned}
b_2 &= \int_{-2\pi}^{2\pi} f\left(\frac{x}{2}\right) \cos x dx \\
&= \frac{a}{2} \int_{-2\pi}^{\pi} (\pi - x) \cos x dx + \frac{a}{2} \int_{\pi}^{2\pi} (x - \pi) \cos x dx \quad : 10\text{점} \\
&= \frac{2}{5\pi^2} \left\{ [(\pi - x) \sin x]_{-2\pi}^{\pi} + \int_{-2\pi}^{\pi} \sin x dx + [(x - \pi) \sin x]_{\pi}^{2\pi} - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x dx \right\} \\
&= \frac{8}{5\pi^2} \quad : 10\text{점}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b_5 &= \int_{-5\pi}^{5\pi} f\left(\frac{x}{5}\right) \cos x dx \\
&= \frac{a}{5} \int_{-5\pi}^{\frac{5}{2}\pi} \left(\frac{5}{2}\pi - x\right) \cos x dx + \frac{a}{5} \int_{\frac{5}{2}\pi}^{5\pi} \left(x - \frac{5}{2}\pi\right) \cos x dx \quad : 10\text{점} \\
&= \frac{4}{25\pi^2} \left\{ \left[\left(\frac{5}{2}\pi - x\right) \sin x \right]_{-5\pi}^{\frac{5}{2}\pi} + \int_{-5\pi}^{\frac{5}{2}\pi} \sin x dx + \left[\left(x - \frac{5}{2}\pi\right) \sin x \right]_{\frac{5}{2}\pi}^{5\pi} - \int_{\frac{5}{2}\pi}^{5\pi} \sin x dx \right\} \\
&= -\frac{8}{25\pi^2} \quad : 10\text{점}
\end{aligned}$$

따라서 $\frac{b_2}{b_5} = -5$ 이다. : 10점

[문제 2]

1. 일반 정보

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 유형 | <input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 | |
| 전형명 | 논술(AAT) 전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호 | 자연계열 I / 2 | |
| 출제 범위 | 수학과 교육과정 과목명 | 기하와 벡터 |
| | 핵심 개념 및 용어 | 공간벡터, 벡터의 내적, 평면의 방정식 |
| 예상 소요 시간 | 전체 시험시간 100분 중 25분 | |

2. 문항 및 제시문

[2] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가) 좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 이은 선분 AB를 $m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는 점 P와 외분하는 점 Q의 좌표는 각각

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n}, \frac{mz_2 + nz_1}{m+n}\right),$$

$$Q\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m-n}, \frac{my_2 - ny_1}{m-n}, \frac{mz_2 - nz_1}{m-n}\right) \quad (\text{단, } m \neq n)$$

이다.

(나) 영벡터가 아닌 두 벡터 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 이 이루는 각의 크기가 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)일 때, \vec{a} 와 \vec{b} 의 내적 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 는

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$$

$$= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

이다.

(다) 좌표공간에서 두 점 $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$ 를 지나는 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1} \quad (\text{단, } x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 \neq z_2)$$

이고, $x_1 \neq x_2, y_1 \neq y_2, z_1 = z_2$ 이면 직선의 방정식은

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}, z = z_1$$

이다.

(라) 좌표공간에서 영벡터가 아닌 벡터 $\vec{n} = (a, b, c)$ 에 수직이고

점 $A(x_1, y_1, z_1)$ 을 지나는 평면의 방정식은

$$a(x-x_1) + b(y-y_1) + c(z-z_1) = 0$$

이다.

좌표공간에 네 점 $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$, $C(0, 0, 1)$, $D(a, b, 1)$ 이 있다. 점 A에서 선분 CD에 내린 수선의 발을 P라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, a, b 는 양수이다.)

【2-1】 (1) 점 P의 좌표를 구하시오. (20점)

(2) 평면 ACD와 xy 평면이 이루는 예각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta$ 를 a 와 b 에 관한 식으로 나타내시오. (20점)

(3) $ab=3$ 일 때, 삼각형 ACD의 넓이의 최솟값을 구하시오. (20점)

【2-2】 선분 AD를 $m:n$ 으로 내분하는 점을 Q라 하자. $a=1$ 이고 $b=3$ 일 때, 직선 AC와 평면 BPQ가 만나지 않기 위한 m 과 n 의 값을 구하시오. (단, m 과 n 은 서로소인 자연수이다.) (40점)

3. 출제 의도

본 문제는 좌표공간에서 공간도형, 공간좌표에 관한 직선과 평면의 위치관계, 삼수선의 정리, 내분점, 내적, 직선의 방정식, 평면의 방정식을 이해하고 공간도형의 문제해결을 위해 이를 종합적으로 판단할 수 있는지를 평가하고자 한다.

2-1. 좌표공간에서 벡터의 내적, 직선의 방정식, 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

2-2. 좌표공간에서 내분점과 평면의 방정식을 구할 수 있고, 직선과 평면의 위치관계를 파악할 수 있는지를 평가하는 문제이다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 | | 관련 성취기준 |
|------------|-----------|--|
| 제시문 (가) | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-2. 공간좌표 (3) 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | 기백1323. 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. |
| 제시문 (나) | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (2) 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | 기백1332. 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| 제시문 (다) | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (4) 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 기백1333. 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. |
| 제시문 (라) | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (5) 좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면과 구의 방정식을 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 기백1334. 좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다. |
| 문제 2-1 | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (4) 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (2) 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-1. 공간도형 (2)삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. (3)정사영의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | 기백1333. 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. 기백1332. 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. 기백1312. 삼수선의 정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 기백1313. 정사영의 뜻을 알고, 정사영의 길이와 넓이를 구할 수 있다. |
| 문제 2-2 | 교육과정 | [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-2. 공간좌표 (3) 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (2) 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다 [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (4) 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 (5) 좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면과 구의 방정식을 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-1. 공간도형 (1) 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | 기백1323. 좌표공간에서 선분의 내분점과 외분점의 좌표를 구할 수 있다. 기백1332. 두 공간벡터의 내적의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 기백1333. 좌표공간에서 벡터를 이용하여 직선의 방정식을 구할 수 있다. [기하와 벡터]-Ⅲ. 공간도형과 공간벡터-3. 공간벡터 기백1334. 좌표공간에서 벡터를 이용하여 평면의 방정식과 구의 방정식을 구할 수 있다. 기백1311. 직선과 직선, 직선과 평면, 평면과 평면의 위치 관계에 대한 간단한 증명을 할 수 있다. |

※ 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책 8] “수학과 교육과정” 및 교육과학기술부 발간 “2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준: 고등학교 수학”(교육과학기술부 발간등록번호 11-1341000-002322-01)에 근거

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행 연도 | 쪽수 |
|----------|--------|-------|------|-------|---------------------------------|
| 고등학교 교과서 | 기하와 벡터 | 이준열 외 | 천재교육 | 2014 | 142-160, 168-179, 188-213 |
| | 기하와 벡터 | 김창동 외 | 교학사 | 2014 | 176-190 |

5. 문항 해설

좌표공간에서 직선과 평면은 많은 분야에 응용이 가능한 가장 기본적인 도구이다. 본 문항의 핵심적인 내용은 「기하와 벡터」의 ‘공간도형과 공간벡터’ 단원에서 다루어진다. 본 문항을 통해 학생들이 제시문을 읽고 벡터의 내분점, 내적, 삼수선의 정리, 직선의 방정식, 평면의 방정식을 잘 이해하고 직선과 평면의 위치관계를 파악할 수 있는지, 풀이 과정을 논리적으로 전개할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|-------|---|----|
| 2-1 | (1) 직선의 방정식을 구한다. | 5 |
| | (1) 선분 AP와 선분 CD의 수직조건을 이용한다. | 10 |
| | (1) 점 P의 좌표를 구한다. | 5 |
| | (2) 삼각형의 면적을 구한다 | 10 |
| | (2) 정사영을 이용하여 $\cos\theta$ 를 구한다. | 10 |
| | (3) 삼각형 ACD의 면적을 구한다. | 10 |
| | (3) 산술기하평균을 이용하여 최솟값을 구한다. | 10 |
| 2-2 | 평면의 방정식을 구한다. | 20 |
| | 직선의 방정식을 구한다. | 5 |
| | 평면의 법선벡터와 직선의 방향벡터가 수직인 조건으로부터 m, n 의 값을 구한다. | 10 |
| | 평면과 직선이 만나지 않음을 보인다. | 5 |

7. 예시 답안

[2-1] (60점)

○ 모범답안: (1) 점 P의 좌표를 (x, y, z) 로 놓자.

직선 CD의 방정식은 $\frac{X}{a} = \frac{Y}{b}, Z=1$ 이고 점 P는 선분 CD위에 있으므로

$$ay = bx, z = 1 \text{ -----㉠}$$

두 벡터 \overrightarrow{CD} 와 \overrightarrow{AP} 의 내적은 0이 되므로

$$a(x-a) + by = 0 \text{ -----㉡}$$

㉠과 ㉡을 연립하면, $x = \frac{a^3}{a^2+b^2}, y = \frac{a^2b}{a^2+b^2}, z = 1$

따라서 $P\left(\frac{a^3}{a^2+b^2}, \frac{a^2b}{a^2+b^2}, 1\right)$ 이다.

- **채점기준:** 직선 CD의 방정식 ㉠을 구한다. (5점)
 선분 AP와 선분 CD의 수직조건으로부터 ㉡을 구한다. (10점)
 ㉠과 ㉡을 연립하여 점 P의 좌표를 구한다. (5점)

(2) 삼각형 ACD의 넓이를 S라 할 때, 선분 AP의 길이를 삼수선의 정리 또는 두 점 사이의 거리를 이용하여 구하면,

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{CD} \times \overline{AP} = \frac{1}{2} \times \sqrt{a^2+b^2} \times \sqrt{1 + \frac{a^2b^2}{a^2+b^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}$$

삼각형 ACD의 xy 평면 위로의 정사영의 넓이는 $\frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2+a^2b^2} \cos\theta = \frac{1}{2} ab$ 이다.

따라서 $\cos\theta = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}}$ 이다.

(별해) 두 평면의 법선벡터를 구하고 그 내적을 이용하여 $\cos\theta$ 를 구할 수 있음.

- **채점기준:** 삼각형 ACD의 넓이를 구한다 (10점)
 정사영을 이용하여 $\cos\theta$ 를 구한다. (10점)

(3) 삼각형 ACD의 넓이는 $\frac{1}{2} \sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}$ 이다. $ab=3$ 이면 산술기하평균에 의해

$$a^2+b^2 \geq 2ab=6 \quad (\text{단, 등호는 } a=b \text{ 일 때 성립한다}).$$

따라서 넓이의 최솟값은 $\frac{\sqrt{15}}{2}$

- **채점기준:** 삼각형 ACD의 넓이를 구한다 (10점)
 산술기하평균을 이용하여 최솟값을 구한다. (10점)

[2-2] (40점)

○ **모범답안:** $a=1, b=3$ 일 때, 점 B의 좌표는 $(0, 3, 0)$, 점 P의 좌표는 $\left(\frac{1}{10}, \frac{3}{10}, 1\right)$ 이고

점 Q의 좌표는 $\left(1, \frac{3m}{m+n}, \frac{m}{m+n}\right)$ 이다.

두 벡터 $\overrightarrow{BP} = \left(\frac{1}{10}, -\frac{27}{10}, 1\right), \overrightarrow{BQ} = \left(1, \frac{-3n}{m+n}, \frac{m}{m+n}\right)$ 에 수직인 벡터를 $\vec{n} = (\alpha, \beta, \gamma)$ 로 놓으면,

$$\frac{\alpha}{10} - \frac{27}{10}\beta + \gamma = 0 \quad \text{-----㉠}$$

$$\alpha - \frac{3n}{m+n}\beta + \frac{m}{m+n}\gamma = 0 \quad \text{-----㉡}$$

㉠과 ㉡을 연립하여 평면 BPQ의 법선벡터 \vec{n} 을 구하면, $\vec{n} = \left(\frac{-27m+30n}{9m+10n}, 1, \frac{27m+24n}{9m+10n}\right)$

(평면의 방정식을 $\alpha x + \beta y + \gamma z + 1 = 0$ 으로 놓고 평면의 방정식을 구할 수도 있음.)

직선 AC의 방정식은 $-x = z - 1, y = 0$ 이고 방향벡터는 $(-1, 0, 1)$ 이다.

직선과 평면이 만나지 않기 위해서는 평면의 법선벡터와 직선의 방향벡터가 수직이어야 하므로 $27m - 30n + 27m + 24n = 0$ 이다.

따라서 $m:n=1:9$ 이므로 $m=1, n=9$ 이다.

이때, 평면의 방정식은 $27x+11y+27z-33=0$ 이므로 $y=0$ 에서 $x+z=\frac{11}{9}$ 이 되어 직선 AC와 만나지 않는다.

(별해)

점 P는 선분 CD를 $a^2:b^2$ 의 비로 내분하는 점이므로 직선 AC와 직선 PQ가 평행하기 위한 내분점 Q의 비는 $a=1, b=3$ 일 때 1:9가 된다. 이때, 평면 ACD와 점 B가 한 평면 위에 존재하지 않기 때문에 직선 AC와 평면 BPQ는 만나지 않는다.

○ **채점기준:** 평면 BPQ의 법선벡터 또는 평면의 방정식을 구한다. (20점)

직선 AC의 방정식을 구한다. (5점)

평면의 법선벡터와 직선의 방향벡터가 수직조건으로부터 m, n 의 값을 구한다. (10점)

평면과 직선이 만나지 않음을 보인다. (5점)

[문제 3]

1. 일반 정보

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| 유형 | <input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 | |
| 전형명 | 논술(AAT) 전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항 번호 | 자연계열1 / 수학 1-3 | |
| 출제 범위 | 수학과 교육과정 과목명 | 확률과 통계 |
| | 핵심 개념 및 용어 | 순열, 조합, 확률, 조건부확률 |
| 예상 소요 시간 | 전체 시험시간 100분 중 25분 | |

2. 문항 및 제시문

[제시문]

| |
|--|
| <p>(가) (1) 서로 다른 n개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 순열의 수는</p> ${}_n P_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$ <p>이다.</p> <p>(2) 서로 다른 n개에서 r ($0 \leq r \leq n$)개를 택하는 조합의 수는 ${}_n C_r = \frac{{}_n P_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$이다. 단, ${}_n C_0 = 1$이다.</p> <p>(3) 서로 다른 n개에서 r개를 택하는 중복순열의 수는 ${}_n \Pi_r = n^r$이다.</p> <p>(나) (1) 어떤 시행에서 원소가 유한개인 표본공간 S에 대하여 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A가 일어날 확률 $P(A)$는</p> $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ <p>로 정의한다. (단, $n(A)$는 사건 A의 원소의 개수이다.)</p> <p>(2) 두 사건 A, B에 대하여</p> $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ <p>가 성립한다. $A \cup B$는 A 또는 B가 일어나는 사건이고, $A \cap B$는 A와 B가 동시에 일어나는 사건이다.</p> <p>(3) 확률이 0이 아닌 사건 A가 일어났다는 조건 아래에서 사건 B가 일어날 확률을 사건 A가 일어났을 때의 사건 B의 조건부확률이라 하고, 기호 $P(B A)$로 나타내며 다음과 같이 정의한다.</p> $P(B A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) \neq 0)$ |
|--|

[문항]

【3-1】 1부터 4까지의 자연수가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 세 학생 A, B, C가 순서대로 상자에서 공을 한 개씩 꺼내어 숫자를 확인한 후 다시 상자에 넣는 시행을 하려고 한다. 세 학생 A, B, C가 공을 꺼내는 경우의 수와 각 학생이 서로 다른 숫자가 적힌 공을 꺼내는 경우의 수를 각각 구하시오. (20점)

(2) 상자에 들어 있는 4개의 공을 꺼내어 세 학생 A, B, C에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 단, 한 개의 공도 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, 세 학생 A, B, C가 각 공을 받을 확률은 모두 같다. 세 학생 A, B, C 모두 적어도 한 개의 공을 받을 확률을 구하시오. (20점)

(3) **【3-1】** (2)에서 세 학생 A, B, C 모두 적어도 한 개의 공을 받았다고 할 때, 학생 A가 받은 공에 적힌 수가 모두 짝수일 확률을 구하시오. (20점)

【3-2】 두 사건 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|--|
| (a) $\frac{1}{2} < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ |
| (b) $P(A) + P(B) = P(A B)$ |

$P(A) = c$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $P(B) = p$ 일 때 $P(A \cup B)$ 가 최댓값 q 를 가진다. $p + \sqrt{q}$ 의 값을 구하시오. (20점)

(2) $P(A \cup B)$ 가 최대일 때, $cP(B|A)$ 의 값은 $\alpha c^2 + \beta c + \gamma$ 이다. $2\alpha + \beta + \gamma$ 의 값을 구하시오. (단, α, β, γ 는 유리수이다.) (20점)

3. 출제 의도

본 문제는 순열과 조합을 활용하여 확률을 구하고, 확률의 기본법칙과 조건부확률을 이해하고 있는지를 평가하고자 한다.

3-1 순열, 중복순열 그리고 조합의 뜻을 이해하고 이를 이용하여 주어진 상황에 대한 경우의 수를 구할 수 있다. 또한 그 경우의 수를 이용하여 주어진 사건에 대한 확률을 구할 수 있는지 평가하고자 한다.

3-2 확률의 의미와 그 기본 성질 그리고 조건부 확률을 이해하고 이를 활용하여 다양한 확률을 구할 있는지 평가하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 | | 관련 성취기준 |
|--------------|-----------|--|
| 제시문1 | 교육과정 | [확률과 통계] - (가) 순열과 조합 - ㉠경우의 수, ㉡순열과 조합 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 순열의 뜻을 알고, 순열의 수를 구할 수 있다. 2. 조합의 뜻을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다. 3. 중복순열의 뜻을 알고, 그 순열의 수를 구할 수 있다. |
| 제시문2 | 교육과정 | [확률과 통계] - (나) 확률 - ㉠확률의 뜻과 활용, ㉡조건부확률 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 통계적 확률, 수학적 확률의 의미와 확률의 기본 성질을 이해한다. 2. 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 3. 조건부확률의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| 문항3-1 (1) | 교육과정 | [확률과 통계] - (가) 순열과 조합 - ㉠경우의 수, ㉡순열과 조합 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 순열의 뜻을 알고, 순열의 수를 구할 수 있다. 2. 조합의 뜻을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다. 3. 중복순열의 뜻을 알고, 그 순열의 수를 구할 수 있다. |
| 문항3-1 (2) | 교육과정 | [확률과 통계] - (가) 순열과 조합 - ㉠경우의 수, ㉡순열과 조합 [확률과 통계] - (나) 확률 - ㉠확률의 뜻과 활용, ㉡조건부확률 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 순열의 뜻을 알고, 순열의 수를 구할 수 있다. 2. 조합의 뜻을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다. 3. 중복순열의 뜻을 알고, 그 순열의 수를 구할 수 있다. 4. 통계적 확률, 수학적 확률의 의미와 확률의 기본 성질을 이해한다. |
| 문항3-1 (3) | 교육과정 | [확률과 통계] - (가) 순열과 조합 - ㉠경우의 수, ㉡순열과 조합 [확률과 통계] - (나) 확률 - ㉠확률의 뜻과 활용, ㉡조건부확률 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 순열의 뜻을 알고, 순열의 수를 구할 수 있다. 2. 조합의 뜻을 알고, 조합의 수를 구할 수 있다. 3. 통계적 확률, 수학적 확률의 의미와 확률의 기본 성질을 이해한다. 4. 조건부확률의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| 문항3-2 (1) | 교육과정 | [확률과 통계] - (나) 확률 - ㉠확률의 뜻과 활용, ㉡조건부확률 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 2. 조건부확률의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |
| 문항3-2 (2) | 교육과정 | [확률과 통계] - (나) 확률 - ㉠확률의 뜻과 활용, ㉡조건부확률 |
| | 성취기준·성취수준 | 1. 통계적 확률, 수학적 확률의 의미와 확률의 기본 성질을 이해한다. 2. 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다. 3. 조건부확률의 뜻을 알고, 이를 구할 수 있다. |

※ 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책 8] “수학과 교육과정” 및 교육과학기술부 발간 “2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준: 고등학교 수학”(교육과학기술부 발간등록번호 11-1341000-002322-01)에 근거

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행 연도 | 쪽수 |
|-------------|--------|--------------|------------|-------|-----------------|
| 고등학교 교과서 | 확률과 통계 | 우정호 외 24명 | 동아출판 | 2014 | 10-67 94-125 |
| | 확률과 통계 | 신항균 외 11명 | 지학사 | 2014 | 12-35 62-85 |
| | 확률과 통계 | 류희찬 외 17명 | 천재교과서 | 2014 | 12-42 78-103 |
| | 확률과 통계 | 황선욱 외 10명 | 좋은책 신사고 | 2014 | 12-34 62-81 |

5. 문항 해설

- 3-1** (1) 문항은 순열과 중복순열을 이해하고 이를 이용하여 사건의 경우의 수를 구할 수 있는지 알아보는 문제이다. 그리고 (2) 문항은 중복순열과 조합을 이용하여 사건의 경우의 수를 구하고 이를 이용하여 확률을 구할 수 있는지 알아보는 문제이다. (3) 문항은 순열과 조합을 이용하여 경우의 수를 구하고 이를 이용하여 원하는 조건부확률을 구할 수 있는지 알아보는 문제이다.
- 3-2** (1) 문항은 확률의 기본성질인 덧셈정리 등과 조건부확률의 뜻을 이해하고 이를 이용하여 합사건의 확률이 최대가 될 때의 조건을 구할 수 있는지를 알아보는 문제이다. (2) 문항은 조건부확률의 성질을 이용하여 원하는 확률을 구할 수 있는지 알아보는 문제이다.

6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|------------|---|----|
| 3-1 (1) | 1. 학생 A,B,C가 공을 꺼내는 경우의 수를 구하면 10점 2. 각 학생이 서로 다른 공을 꺼내는 경우의 수를 구하면 10점 | 20 |
| 3-1 (2) | 1. 4개의 공을 세 학생 A,B,C에게 임의로 나누어 주는 경우의 수를 구하면 5점 2. 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 받을 경우의 수를 구하면 각 10점 3. 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 가질 확률을 구하면 5점 | 20 |
| 3-1 (3) | 1. 조건에 해당하는 경우의 수를 구하였을 경우 10점 2. 조건부확률을 구하면 10점 | 20 |
| 3-2 (1) | 1. 주어진 관계식을 이용하여 p 와 q 를 구하면 각각 5점 2. $p + \sqrt{q}$ 의 값을 구하면 10점 | 20 |
| 3-2 (2) | 1. 주어진 관계식을 이용하여 α, β, γ 의 값을 구하면 각각 5점 2. $2\alpha + \beta + \gamma$ 를 구하면 5점 | 20 |

7. 예시 답안

[3-1]

(1) 세 학생 A, B, C가 상자에서 한 개의 공을 꺼내어 숫자를 확인한 후 다시 상자에 넣는 시행을 순서대로 한 번씩 하였을 때 세 학생 A, B, C가 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_4\Pi_3 = 4^3 = 64$ 이고, 각 학생이 서로 다른 숫자가 적힌 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_4P_3 = {}_4C_3 \times 3! = 24$ 이다.

(2) 4개의 공을 세 학생 A, B, C에게 임의로 나누어 주는 경우의 수는 ${}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$ 이고, 이 중 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 받을 경우의 수는 $\frac{{}_4C_1 \times {}_3C_1 \times {}_2C_2}{2!} \times 3! = 36$ 이다. 따라서 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 받을 확률은 $\frac{36}{81}$ 즉 $\frac{4}{9}$ 이다.

(3) 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 받았다는 조건 하에서 학생 A가 받은 공이 모두 짝수일 경우는

(i) 학생 A가 2와 4가 적힌 공을 받은 경우의 수: 2

(ii) 학생 A가 2가 적힌 공만을 받은 경우의 수: 6

(iii) 학생 A가 4가 적힌 공만을 받은 경우의 수: 6

이므로 총 14가지이다. 따라서 모든 학생이 적어도 한 개의 공을 받았다는 조건 하에서 A학생

이 받은 공에 적힌 수가 모두 짝수일 확률은 $\frac{14}{36}$ 즉 $\frac{7}{18}$ 이다.

[3-2]

(1) 주어진 조건으로부터 $P(A) + P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 이고

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 이므로

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(B)\{P(A) + P(B)\}$ 이다. $P(A) = c$ 라고 하면

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= c + P(B) - cP(B) - \{P(B)\}^2 = -\left\{P(B) - \frac{1-c}{2}\right\}^2 + c + \frac{(1-c)^2}{4} \\ &= -\left\{P(B) - \frac{1-c}{2}\right\}^2 + \frac{(1+c)^2}{4} \end{aligned}$$

이다. 따라서, $P(B) = \frac{1-c}{2}$ 일 때, $P(A \cup B)$ 의 최댓값은 $\frac{(1+c)^2}{4}$ 이므로

$$p + \sqrt{q} = \frac{1-c}{2} + \sqrt{\frac{(1+c)^2}{4}} = \frac{1-c}{2} + \frac{1+c}{2} = 1 \text{ 이다.}$$

(2) 주어진 조건으로부터

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)} = \frac{\{P(A) + P(B)\}P(B)}{P(A)} = \frac{\left(c + \frac{1-c}{2}\right) \frac{1-c}{2}}{c} = \frac{\left(\frac{1+c}{2}\right) \frac{1-c}{2}}{c}$$

이므로 $cP(B|A) = \frac{1-c^2}{4}$ 이다. 따라서 $\alpha = -\frac{1}{4}$, $\beta = 0$, $\gamma = \frac{1}{4}$ 이고 $2\alpha + \beta + \gamma = -\frac{1}{4}$ 이다.

[문제 4]

1. 일반 정보

| | | |
|-------------------------|---|----------------------|
| 유형 | <input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사 | |
| 전형명 | 논술(AAT) 전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목)/ 문항 번호 | 자연계열1 / 수학 1-4 | |
| 출제 범위 | 수학과 교육과정 과목명 | 미적분 I, 미적분 II |
| | 핵심 개념 및 용어 | 다항함수, 미분, 적분, 곡선의 개형 |
| 예상 소요 시간 | 전체 시험시간 100분 중 25분 | |

2. 문항 및 제시문

[제시문]

(가) 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

이다.

(나) 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (\text{단, } a < x < b)$$

이다.

(다) 함수 $f(x)$ 의 이계도함수 $f''(x)$ 가 존재할 때,

$$f'(a) = 0, f''(a) > 0$$

이면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

[문항]

두 실수 α, β 에 대하여 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

(a) 방정식 $g(x)=0$ 은 세 실근 1, 3, k 를 갖는다.

(b) $\int_1^3 g(x)dx = \alpha$

(c) $\int_1^3 |g(x)|dx = \beta$

다음 물음에 답하시오.

【4-1】 $|\alpha| \neq \beta$ 일 때, 제시문 (가)를 활용하여 $1 < k < 3$ 임을 보이시오. (20점)

【4-2】 제시문 (가), (나), (다)를 활용하여 β 의 최솟값을 구하시오. (40점)

【4-3】 $1 < k < 3$ 일 때, $\beta = \frac{2}{3}$ 가 되는 모든 k 의 값의 곱은 $p+q\sqrt{2}$ 이다. 다음 식을 활용하여 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 유리수이다.) (40점)

$$\beta = a + b(k+m)^2 + c(k+m)^4$$

(단, a, b, c, m 은 상수이다.)

3. 출제 의도

본 문제는 사차함수의 곡선의 개형에 관한 기본적인 내용을 평가하고자 한다. 구체적으로 삼차함수에 대한 정적분 형태로 주어지는 사차함수의 성질을 파악할 수 있는지를 평가하고자 한다. 특히, 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이의 개념 및 미분과 적분의 관계를 활용하여 다음의 사항들을 평가하고자 한다.

[4-1] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이의 개념을 이해하고 이를 활용하여 삼차방정식의 근의 위치를 파악할 수 있는지를 평가한다.

[4-2] 함수의 그래프의 개형을 알기 위하여 이계도함수를 활용할 수 있는지를 평가한다.

[4-3] 미분과 적분의 관계와 이계도함수를 활용하여 삼차함수의 정적분으로 주어진 사차함수와 직선이 만나는 교점의 x 좌표를 구할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

| 문항 및 제시문 | | 관련 성취기준 |
|------------|-----------|--|
| 제시문 (가) | 교육과정 | [미적분 II] - (라) 적분법 ㉔ 정적분의 활용 ① 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 II] - (4) 적분법 (나) 정적분의 활용 미적2421. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. |
| 제시문 (나) | 교육과정 | [미적분 I] - (라) 다항함수의 적분법 ㉔ 정적분 ③ 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 I] - (4) 다항함수의 적분법 (나) 정적분 미적1423. 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. |
| 제시문 (다) | 교육과정 | [미적분 II] - (다) 미분법 ㉑ 여러 가지 미분법 ④ 이계도함수를 구할 수 있다. [미적분 II] - (다) 미분법 ㉔ 도함수의 활용 ② 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 II] - (3) 미분법 (가) 여러 가지 미분법 미적2314. 이계도함수를 구할 수 있다. [미적분 II] - (3) 미분법 (나) 도함수의 활용 미적2322. 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. |
| 문항4-1 | 교육과정 | [미적분 II] - (라) 적분법 ㉔ 정적분의 활용 ① 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 II] - (4) 적분법 (나) 정적분의 활용 미적2421. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. |
| 문항4-2 | 교육과정 | [미적분 II] - (라) 적분법 ㉔ 정적분의 활용 ① 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. [미적분 I] - (라) 다항함수의 적분법 ㉔ 정적분 ③ 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. [미적분 II] - (다) 미분법 ㉑ 여러 가지 미분법 ④ 이계도함수를 구할 수 있다. [미적분 II] - (다) 미분법 ㉔ 도함수의 활용 ② 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 II] - (4) 적분법 (나) 정적분의 활용 미적2421. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. [미적분 I] - (4) 다항함수의 적분법 (나) 정적분 미적1423. 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. [미적분 II] - (3) 미분법 (가) 여러 가지 미분법 미적2314. 이계도함수를 구할 수 있다. [미적분 II] - (3) 미분법 (나) 도함수의 활용 미적2322. 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다. |
| 문항4-3 | 교육과정 | [미적분 II] - (라) 적분법 ㉔ 정적분의 활용 ① 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. [미적분 I] - (라) 다항함수의 적분법 ㉔ 정적분 ③ 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. |
| | 성취기준·성취수준 | [미적분 II] - (4) 적분법 (나) 정적분의 활용 미적2421. 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다. [미적분 I] - (4) 다항함수의 적분법 (나) 정적분 미적1423. 부정적분과 정적분의 관계를 이해하고 이를 이용하여 정적분을 구할 수 있다. |

※ 교육과학기술부 고시 제2011-361호[별책 8] “수학과 교육과정” 및 교육과학기술부 발간 “2009 개정 교육과정에 따른 성취기준·성취수준: 고등학교 수학”(교육과학기술부 발간등록번호 11-1341000-002322-01)에 근거

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행 연도 | 쪽수 |
|----------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 고등학교 교과서 | 미적분 I | 이강섭 외 | 미래엔 | 2014 | 165-166 |
| | 미적분 II | 이강섭 외 | 미래엔 | 2016 | 177-181 |
| | 미적분 II | 우정호 외 | 동아출판사 | 2016 | 154-159 |

5. 문항 해설

미분과 적분은 자연과학, 공학 및 사회과학에 이르기까지 광범위한 분야에서 널리 활용되어지는 가장 기본적인 수학적 도구 중 하나이다. 본 문제의 핵심적인 내용은 「미적분 I」와 「미적분 II」의 정적분의 활용과 도함수의 활용 단원에서 다루어진다. 따라서 본 문제를 통해 학생들이 제시문을 읽고 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이의 개념을 이해하고 삼차방정식의 근의 위치를 파악할 수 있는지, 미분과 적분의 관계와 이계도함수의 성질을 이용하여 삼차함수의 정적분으로 주어진 사차함수의 최솟값을 구할 수 있는지, 미분과 적분의 관계를 이용하여 삼차함수의 정적분으로 주어진 사차함수와 직선이 만나는 해를 구할 수 있는지, 풀이과정을 논리적으로 전개할 수 있는지 등을 종합적으로 평가하고자 한다. 구체적으로 각 소문항에서 다음을 평가하고자 한다.

- [4-1] 본 문항은 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이의 개념을 이해하고 이를 활용하여 삼차방정식의 근의 위치를 파악할 수 있는지를 평가한다.
- [4-2] 본 문항은 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이의 개념, 미분과 적분의 관계 및 이계도함수를 활용하여 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있는지를 종합적으로 평가한다.
- [4-3] 본 문항은 미분과 적분의 관계 및 이계도함수를 활용하여 삼차함수의 정적분으로 주어진 사차함수와 직선이 만나는 교점의 x 좌표를 구할 수 있는지를 평가한다.

6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|-------|--|-----|
| [4-1] | $1 < k < 3$ 을 만족하지 않는 k 에 대하여 함수 $g(x)$ 는 (a) $k \leq 1$ 인 경우 $g(x) \leq 0$ ($1 < x < 3$) (b) $k \geq 3$ 인 경우 $g(x) \geq 0$ ($1 < x < 3$) 이다. | 10점 |
| | 따라서 제시문 (가)에 의하여 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1, x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 (a)와 (b) 두 가지 경우 모두 $\beta = \int_1^3 g(x) dx = \left \int_1^3 g(x)dx \right = \alpha $ 이다. 이는 조건 $ \alpha \neq \beta$ 를 만족하지 않는다. 그러므로 $1 < k < 3$ 이다. | 10점 |
| [4-2] | $h(x) = (x-1)(x-3)$ 이라 하면 조건으로부터 삼차함수 $g(x)$ 는 $g(x) = (x-1)(x-3)(x-k) = xh(x) - kh(x)$ 이다. 제시문 (가)에 의하여 | 5점 |

| | | |
|-------|--|-----|
| | $\beta = \begin{cases} k \int_1^3 h(x) dx - \int_1^3 xh(x) dx & (k < 1) \\ \int_1^k xh(x) dx - k \int_1^k h(x) dx - \int_k^3 xh(x) dx + k \int_k^3 h(x) dx & (1 \leq k \leq 3) \\ -k \int_1^3 h(x) dx + \int_1^3 xh(x) dx & (k > 3) \end{cases}$ <p>이다.</p> | |
| | $\int_1^3 h(x) dx < 0$ 이고 $\int_1^3 xh(x) dx < 0$ 이므로 구간 $(-\infty, 1)$ 에서 β 는 감소하고 구간 $(3, \infty)$ 에서 β 는 증가한다. | 5점 |
| | <p>$1 \leq k \leq 3$인 경우, 제시문 (나)에 의하여</p> $\frac{d\beta}{dk} = - \int_1^k h(x) dx + \int_k^3 h(x) dx$ <p>이다. 함수 $h(x)$는 직선 $x=2$를 대칭축으로 하는 이차함수이므로</p> $k=2 \text{일 때, } \frac{d\beta}{dk} = 0$ <p>이다.</p> | 10점 |
| | <p>또한, k에 대하여 β의 이계도함수를 구하면</p> $\frac{d^2\beta}{dk^2} = -2(k-1)(k-3) > 0 \quad (1 < k < 3)$ <p>이다. 따라서 제시문 (다)에 의하여 β는 구간 $(1,3)$에서 아래로 볼록하고 $k=2$에서 극소이다. 그러므로 β는 $k=2$일 때, 최솟값을 가진다.</p> | 10점 |
| | <p>$k=2$일 때, β를 계산하면</p> $\begin{aligned} \beta &= 2 \int_1^2 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + \frac{11}{2}x^2 - 6x \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$ <p>이다. 따라서 β의 최솟값은 $\frac{1}{2}$이다.</p> | 10점 |
| [4-3] | <p>$1 < k < 3$이므로, [4-2]의 풀이에 의하여 β는 k에 대한 사차함수이고 $\beta(2) = \frac{1}{2}$, $\beta'(2) = 0$이므로 $m = -2$이라 두면 주어진 공식으로부터</p> $\beta = \int_1^k xh(x) dx - k \int_1^k h(x) dx - \int_k^3 xh(x) dx + k \int_k^3 h(x) dx \quad \text{----- (a)}$ $= \frac{1}{2} + b(k-2)^2 + c(k-2)^4 \quad (a = \frac{1}{2})$ <p>과 같이 둘 수 있다.</p> | 15점 |
| | <p>식 (a)의 양변을 미분하면</p> $\int_k^3 h(x) dx - \int_1^k h(x) dx = 2b(k-2) + 4c(k-2)^3 \quad \text{----- (b)}$ | 15점 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>(b)의 양변을 미분하면 $-2(k-1)(k-3) = 2b + 12c(k-2)^2$ ----- (c)</p> <p>(c)의 양변을 미분하면 $-4(k-2) = 24c(k-2)$ ----- (d)</p> <p>이다. (c)에 $k=2$를 대입하여 풀면 $b=1$</p> <p>이다. (d)로부터 $c = -\frac{1}{6}$</p> <p>이다.</p> | |
|--|---|--|

7. 예시 답안

[4-1]

$1 < k < 3$ 을 만족하지 않는 k 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

(a) $k \leq 1$ 인 경우 $g(x) \leq 0$ ($1 < x < 3$)

(b) $k \geq 3$ 인 경우 $g(x) \geq 0$ ($1 < x < 3$)

이다.

따라서 제시문 (가)에 의하여 곡선 $y=g(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1, x=3$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이는 (a)와 (b) 두 가지 경우 모두

$$\beta = \int_1^3 |g(x)| dx = \left| \int_1^3 g(x) dx \right| = |\alpha|$$

이다. 이는 조건 $|\alpha| \neq \beta$ 를 만족하지 않는다. 그러므로 $1 < k < 3$ 이다.

[4-2]

$h(x) = (x-1)(x-3)$ 이라 하면 조건으로부터 삼차함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x-1)(x-3)(x-k) = xh(x) - kh(x)$$

이다. 제시문 (가)에 의하여

$$\beta = \begin{cases} k \int_1^3 h(x) dx - \int_1^3 xh(x) dx & (k < 1) \\ \int_1^k xh(x) dx - k \int_1^k h(x) dx - \int_k^3 xh(x) dx + k \int_k^3 h(x) dx & (1 \leq k \leq 3) \\ -k \int_1^3 h(x) dx + \int_1^3 xh(x) dx & (k > 3) \end{cases}$$

이다.

(i) $\int_1^3 h(x) dx < 0$ 이고 $\int_1^3 xh(x) dx < 0$ 이므로 구간 $(-\infty, 1)$ 에서 β 는 감소하고 구간 $(3, \infty)$ 에서 β 는 증가한다.

(ii) $1 \leq k \leq 3$ 인 경우, 제시문 (나)에 의하여

$$\frac{d\beta}{dk} = - \int_1^k h(x) dx + \int_k^3 h(x) dx$$

이다. 함수 $h(x)$ 는 직선 $x=2$ 를 대칭축으로 하는 이차함수이므로

$$k=2 \text{ 일 때, } \frac{d\beta}{dk} = 0$$

이다. 또한, k 에 대하여 β 의 이계도함수를 구하면

$$\frac{d^2\beta}{dk^2} = -2(k-1)(k-3) > 0 \quad (1 < k < 3)$$

이다. 따라서 제시문 (다)에 의하여 β 는 구간 (1,3)에서 아래로 볼록하고 $k=2$ 에서 극소이다. 그러므로 (i)과 (ii)를 종합해보면 β 는 $k=2$ 일 때, 최솟값을 가진다. 한편, $k=2$ 일 때, β 를 계산하면

$$\begin{aligned} \beta &= 2 \int_1^2 (x^3 - 6x^2 + 11x - 6) dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^2 + \frac{11}{2}x^2 - 6x \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이다. 따라서 β 의 최솟값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

[4-3]

$1 < k < 3$ 이므로, [4-2]의 풀이에 의하여 β 는 k 에 대한 사차함수이고 $\beta(2) = \frac{1}{2}$, $\beta'(2) = 0$ 이므로 $m = -2$ 이라 두면 주어진 공식으로부터

$$\begin{aligned} \beta &= \int_1^k xh(x)dx - k \int_1^k h(x)dx - \int_k^3 xh(x)dx + k \int_k^3 h(x)dx \quad \text{---- (a)} \\ &= \frac{1}{2} + b(k-2)^2 + c(k-2)^4 \quad (a = \frac{1}{2}) \end{aligned}$$

과 같이 둘 수 있다.

식 (a)의 양변을 미분하면

$$\int_k^3 h(x)dx - \int_1^k h(x)dx = 2b(k-2) + 4c(k-2)^3 \quad \text{----- (b)}$$

(b)의 양변을 미분하면

$$-2(k-1)(k-3) = 2b + 12c(k-2)^2 \quad \text{----- (c)}$$

(c)의 양변을 미분하면

$$-4(k-2) = 24c(k-2) \quad \text{----- (d)}$$

이다. (c)에 $k=2$ 를 대입하여 풀면

$$b = 1$$

이다. (d)로부터

$$c = -\frac{1}{6}$$

이다. 그러므로 $\beta = \frac{2}{3}$ 를 만족하는 k 는 사차방정식

$$\frac{2}{3} = \frac{1}{2} + (k-2)^2 - \frac{1}{6}(k-2)^4$$

의 근이다. $X = (k-2)^2$ 이라 두고 위의 사차방정식을 정리하면

$$X^2 - 6X + 1 = 0$$

이 된다. $1 < k < 3$ 이므로 $0 < X < 1$ 이다. 따라서 $X^2 - 6X + 1 = 0$ 의 근은

$$X = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2 > 0$$

이다.

$$\begin{aligned} (k-2)^2 &= 3 - 2\sqrt{2} \\ k^2 - 4k + 1 + 2\sqrt{2} &= 0 \end{aligned}$$

이므로 근과 계수의 관계에 의해 k 의 모든 값의 곱은 $1 + 2\sqrt{2}$ 이다.

$p=1$, $q=2$ 이므로 정답은 3이다.

(별해)

$1 < k < 3$ 이므로, β 를 계산하면

$$\begin{aligned}\beta &= \int_1^k xh(x)dx - k \int_1^k h(x)dx - \int_k^3 xh(x)dx + k \int_k^3 h(x)dx \\ &= -\frac{1}{6}(k^4 - 8k^3 + 18k^2 - 8k + 1) + 2\end{aligned}$$

이다. $\beta = \frac{2}{3}$ 의 식을 풀기 위하여 β 의 식을 변형하면

$$\begin{aligned}\beta &= -\frac{k^2}{6} \left\{ k^2 + \frac{1}{k^2} - 8 \left(k + \frac{1}{k} \right) + 18 \right\} + 2 \\ &= -\frac{k^2}{6} \left\{ \left(k + \frac{1}{k} \right)^2 - 8 \left(k + \frac{1}{k} \right) + 16 \right\} + 2\end{aligned}$$

$$= -\frac{k^2}{6} \left(k + \frac{1}{k} - 4 \right)^2 + 2$$

이다. 따라서 $\beta = \frac{2}{3}$ 가 되게 하는 k 는 사차방정식

$$\begin{aligned}8 &= (k^2 - 4k + 1)^4 \\ &= ((k-2)^2 - 3)^2\end{aligned}$$

의 근이다. $X = (k-2)^2$ 이라 두면, $1 < k < 3$ 이므로 $0 < X < 1$ 이다. 따라서

$$X = 3 - 2\sqrt{2} = (\sqrt{2} - 1)^2 > 0$$

이다.

$$\begin{aligned}(k-2)^2 &= 3 - 2\sqrt{2} \\ k^2 - 4k + 1 + 2\sqrt{2} &= 0\end{aligned}$$

이므로 근과 계수의 관계에 의해 k 의 모든 값의 곱은 $1 + 2\sqrt{2}$ 이다. $p=1$, $q=2$ 이므로 정답은 3이다.