

2017학년도 세종대학교 수시모집 논술고사 채점기준표(자연계열 B형)

하위 문항	채점 기준	배점
1-1	<ul style="list-style-type: none"> • $2r_1(t)r'(t) = \left(t - \frac{1}{3}\right)r_1(t)$ 또는 $r'(t) = \frac{t}{2} - \frac{1}{6}$: 30점 • $r_1'(2) = r_1'(2) = \frac{5}{6}$: 60점 	60
1-2	<ul style="list-style-type: none"> • $r_1(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{6}t + k$까지: 10점 • $k^2 = k$까지: 50점 • $r_1(2) = \frac{5}{3}$: 60점 	60
1-3	<ul style="list-style-type: none"> • 점 P $\left(\frac{25\sqrt{3}}{42}, \frac{5}{14}\right)$: +20점 • 점 Q $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$: +20점 • $q'(2) = \frac{\sqrt{3}}{20}$: +20점 ($q'(2) = -\frac{\sqrt{3}}{20}$ 만 있으면: +10점만) 	60

하위 문항	채점 기준	배점
2-1	<ul style="list-style-type: none"> • 점 A와 H를 지나는 직선 $x = 4 + t, y = 4 + 2t, z = 3 + 2t$: 30점 • $(3, 2, 1)$: 60점 	60
2-2	<ul style="list-style-type: none"> • $\overline{AH} = 3$: +20점 • $\overline{HQ} = \frac{1}{2}$: +20점 • $\frac{\sqrt{37}}{2}$: +20점 	60
2-3	<ul style="list-style-type: none"> • ℓ'의 방향벡터가 $(2, 2, -3)$의 상수배까지: 20점 • 점 B와의 거리 $\frac{\sqrt{17}}{2}$까지: 50점 • 점 B와 직선 ℓ'의 거리 $\frac{\sqrt{17}}{2} > 2$: 60점 	60

하위 문항	채점 기준	배점
3-1	<ul style="list-style-type: none"> • $a = 2$: +20점 • $b = 5$: +40점 	60
3-2	<ul style="list-style-type: none"> • $p(x)q(x) \leq \frac{\{p(x)\}^2 + \{q(x)\}^2}{2}$ 까지: 20점 • $\int_0^1 p(x)q(x)dx \leq 2$까지: 40점 • $p(x) = q(x) = \sqrt{2}$를 이용하여 최댓값이 2인 것까지: 60점 	60
3-3	<ul style="list-style-type: none"> • $2g(x)\sqrt{x^3+1} \leq \{g(x)\}^2 + x^3 + 1$ 까지: 20점 • $\int_0^2 g(x)\sqrt{x^3+1} dx \leq 6$ 까지: 40점 • $g(x) = \sqrt{x^3+1}$을 이용하여 최댓값이 6인 것 까지: 60점 	60
3-4	<ul style="list-style-type: none"> • $\int_0^k 12h(x)h'(x)dx \leq 6$까지: 15점 • $\{h(k)\}^2 \leq 5$까지: 30점 • $h(x) = 2e^{\frac{3}{2}x}$까지: 40점 • $e^{3k} = \frac{5}{4}$ 또는 $k = \frac{1}{3}\ln\frac{5}{4}$ 까지: 50점 • $h(k)$의 최댓값이 $\sqrt{5}$인 것까지: 60점 	60

2017학년도 세종대학교 수시모집 논술고사 답안 예시(자연계열 B형)

[문제 1]

(1-1) 준식 $r_1(t)^2 = \int_0^t \left(x - \frac{1}{3}\right) r_1(x) dx + \int_0^1 r_1(x) dx$ 의 양변을 미분하면
 $2r_1(t)r_1'(t) = \left(t - \frac{1}{3}\right)r_1(t)$ 이므로, $r_1'(t) = \frac{1}{2}t - \frac{1}{6}$ 이다. 따라서 $t=2$ 에서 원 C_1 의 중심
 의 속력은 $|r_1'(2)| = r_1'(2) = \frac{5}{6}$ 이다.

(1-2) $r_1'(t) = \frac{1}{2}t - \frac{1}{6}$ 로부터 $r_1(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{6}t + k$ 이고, 모든 $t \geq 0$ 에서
 $r_1(t) > 0$ 이므로 $k = r_1(0) > 0$ 이다. 준식
 $r_1(t)^2 = \int_0^t \left(x - \frac{1}{3}\right) r_1(x) dx + \int_0^1 r_1(x) dx$ 로부터 $r_1(0)^2 = \int_0^1 r_1(x) dx$ 인데,
 $r_1(0) = k$ 이고 $\int_0^1 r_1(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{6}x + k\right) dx = k$ 이므로, $k^2 = k$ 가 된다.
 $k > 0$ 이므로 $k = 1$ 이다.

따라서 $r_1(t) = \frac{1}{4}t^2 - \frac{1}{6}t + 1$ 이므로 $r_1(2) = \frac{5}{3}$ 이다.

(1-3) 시각 t 에서 원 C_2 의 중심 O_2 의 좌표는

$O_2 = \left(\sqrt{(r_1(t) + r_2(t))^2 - (r_1(t) - r_2(t))^2}, r_2(t)\right) = \left(2\sqrt{r_1(t)r_2(t)}, r_2(t)\right)$ 이다.
 점 P 는 선분 O_1O_2 를 $r_1(t) : r_2(t)$ 로 내분하는 점이므로, 점 P 의 좌표는
 $\left(\frac{r_1 \cdot 2\sqrt{r_1r_2} + r_2 \cdot 0}{r_1 + r_2}, \frac{r_1r_2 + r_2r_1}{r_1 + r_2}\right) = \left(\frac{2r_1\sqrt{r_1r_2}}{r_1 + r_2}, \frac{2r_1r_2}{r_1 + r_2}\right)$ 이다.

$r_1(2) = \frac{5}{3}$, $r_2(2) = \frac{1}{5}$ 이므로, $t=2$ 에서 점 P 의 좌표는 $\left(\frac{25\sqrt{3}}{42}, \frac{5}{14}\right)$ 이다.

직선 ℓ 은 점 P 에서 원 C_1 에 접하고, $C_1 : x^2 + (y - r_1)^2 = r_1^2$ 이므로,

$P\left(\frac{2r_1\sqrt{r_1r_2}}{r_1 + r_2}, \frac{2r_1r_2}{r_1 + r_2}\right) = P(a, b)$ 라 할 때, P 에서 C_1 의 접선의 식은

$\ell : ax + (b - r_1)(y - r_1) = r_1^2$ 이다.

(원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선 공식 $x_1x + y_1y = r^2$ 을 평행 이동하여 얻을 수 있다.)

Q 의 좌표를 $(q, 0)$ 이라 하면, $aq + (b - r_1)(0 - r_1) = r_1^2$ 이 되어,

$q(t) = \frac{b}{a}r_1(t) = \sqrt{r_1(t)r_2(t)}$ 이다. 따라서 $t=2$ 에서 점 Q 의 좌표는 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right)$ 이다.

$q'(t) = \frac{r_1'(t)r_2(t) + r_1(t)r_2'(t)}{2\sqrt{r_1(t)r_2(t)}}$ 이고 $r_1(2) = \frac{5}{3}$, $r_2(2) = \frac{1}{5}$, $r_1'(2) = \frac{5}{6}$,

$r_2'(2) = -\frac{4}{25}$ 이므로, $t=2$ 에서 점 Q 의 속력은 $|q'(2)| = -q'(2) = \frac{\sqrt{3}}{20}$ 이다.

[문제 2]

(2-1) $(1, 2, 2)$ 가 평면에 수직인 벡터이므로 점 A 와 점 H 를 지나는 직선의 방정식은
 $x = 4 + t, y = 4 + 2t, z = 3 + 2t$ 이고 이 직선이 평면 α 와 만나는 점이 H 이므로
 $(4 + t) + 2(4 + 2t) + 2(3 + 2t) = 9$ 를 만족한다. 따라서 $t = -1$ 이 되어 점 H 의 좌표는
 $(3, 2, 1)$ 이 된다.

(2-2) $\overline{AQ}^2 = \overline{AH}^2 + \overline{HQ}^2 = 9 + \overline{HQ}^2$ 이므로 \overline{AQ} 최솟값은 \overline{HQ} 가 최솟값을 가질
 때이고, \overline{HQ} 의 최솟값은 B 와 H 를 지나는 직선이 B 를 중심으로 하고 반지름이 2인
 원과 만나는 점이 Q 일 때이다. 이 때, H 와 B 간의 거리가 $\frac{3}{2}$ 이므로 \overline{HQ} 의 최솟값은
 $2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$ 이다. 따라서 \overline{AQ}^2 의 최솟값은 $9 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{37}{4}$ 이다. 답은 $\frac{\sqrt{37}}{2}$ 이다.

(2-3)

점 B 와 직선 ℓ 위의 한 점 $(2t + 2, 2t - 1, -3t + 6)$ 사이의 거리를 d 라 하면,
 $d^2 = (2t)^2 + (2t - \frac{5}{2})^2 + (-3t + 4)^2$ 이고 이 식을 미분하면 $t = 1$ 일 때 d^2 은 최솟값
 $\frac{21}{4}$ 을 가진다. 따라서 점 B 와 직선 ℓ 사이의 거리는 $\frac{\sqrt{21}}{2}$ 이다. 또한
 $(2, 2, -3) \cdot (1, 2, 2) = 0$ 이므로 직선 ℓ 과 평면 α 는 평행하다. 따라서 점 B 와 직선 ℓ 의
 최소거리가 되는 ℓ 위의 점을 T_1 , 점 B 와 직선 ℓ' 의 최소거리가 되는 ℓ' 위의 점을
 T_2 라 하면 T_2 는 T_1 을 평면 α 에 내린 수선의 발이다. 직선 ℓ 과 평면 α 사이의
 거리가 1이므로 피타고라스정리에 의하여 점 B 와 직선 ℓ' 의 거리는 $\frac{\sqrt{17}}{2} > 2$ 가
 되므로 직선 ℓ' 은 집합 S 에 속한다.

[문제 3]

(3-1) $a = f(0) = 2$ 에서 $a = 2$ 이다. $f'(x) = ab e^{bx} = 5f(x) = 5a e^{bx}$ 에서 $b = 5$ 이다.

(3-2) 산술평균과 기하평균과의 관계를 이용하면

$$p(x)q(x) \leq \frac{\{p(x)\}^2 + \{q(x)\}^2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

이므로 $p(x)q(x)$ 의 값은 2 이하이다.

(절대부등식 $\{p(x)\}^2 - 2p(x)q(x) + \{q(x)\}^2 = \{p(x) - q(x)\}^2 \geq 0$ 임을 이용하여 증명
 해도 된다.)

그러므로 $2 - p(x)q(x) \geq 0$ 이고

$$\int_0^1 2dx - \int_0^1 p(x)q(x)dx = \int_0^1 (2 - p(x)q(x))dx \geq 0$$

따라서 $\int_0^1 p(x)q(x)dx \leq \int_0^1 2dx = 2$ 인데, $p(x)$ 와 $q(x)$ 가 모두 상수함수 $\sqrt{2}$ 이면, 이 식의 등호가 성립하며, $p(x)$ 와 $q(x)$ 는 문제의 조건을 모두 만족시킨다. 따라서 $\int_0^1 p(x)q(x)dx$ 의 최댓값은 2이다.

(3-3) $0 \leq x \leq 2$ 인 임의의 실수 x 에 대하여 $\{g(x) - \sqrt{x^3+1}\}^2 \geq 0$ 임을 이용하면

$$2g(x)\sqrt{x^3+1} \leq \{g(x)\}^2 + x^3 + 1 \quad \dots\dots\dots (1)$$

이다. (산술평균과 기하평균과의 관계를 이용해도 식 (1)이 보여진다.) 따라서

$$\begin{aligned} 2 \int_0^2 g(x)\sqrt{x^3+1} dx &\leq \int_0^2 (\{g(x)\}^2 + x^3 + 1) dx \quad \dots\dots\dots (2) \\ &= \int_0^2 \{g(x)\}^2 dx + \int_0^2 (x^3 + 1) dx \\ &= 6 + 6 \\ &= 12 \end{aligned}$$

이므로

$$\int_0^2 g(x)\sqrt{x^3+1} dx \leq 6 \quad \dots\dots\dots (3)$$

이다. 그런데 (1)의 등호는

$$g(x) = \sqrt{x^3+1}$$

일 때 성립하고 이 때 식 (2), (3)의 등호도 모두 성립한다. 또한 함수 $g(x) = \sqrt{x^3+1}$ 는 조건 (가), (나)를 모두 만족시킨다. 따라서 $\int_0^2 g(x)\sqrt{x^3+1} dx$ 의 최댓값은 6이다.

(3-4) (나)의 식에서 $k > 0$ 임이 분명하다. 또한 임의의 실수 x 에 대하여

$$12h(x)h'(x) = 2 \cdot 3h(x) \cdot 2h'(x) \leq \{3h(x)\}^2 + \{2h'(x)\}^2 = 9\{h(x)\}^2 + 4\{h'(x)\}^2$$

이므로

$$\int_0^k 12h(x)h'(x)dx \leq \int_0^k (9\{h(x)\}^2 + 4\{h'(x)\}^2)dx = 6 \quad \dots\dots\dots (4)$$

이다. (산술-기하 평균을 이용하여 보일 수도 있다.)

이 때, $t = h(x)$ 로 두고 치환적분법을 이용하여 계산하면

$$\begin{aligned} \int_0^k 12h(x)h'(x)dx &= 6 \int_0^k 2h(x)h'(x)dx \\ &= 6\{h(k)^2 - h(0)^2\} \\ &= 6h(k)^2 - 24 \end{aligned}$$

이므로

$$\{h(k)\}^2 \leq \frac{30}{6} = 5 \quad \dots\dots\dots (5)$$

이다. 부등식 (4)의 등호는 $3h(x) = 2h'(x)$ 일 때, 즉

$$h'(x) = \frac{3}{2}h(x) \quad \dots\dots\dots (6)$$

일 때 성립한다. 조건 (가)에서 $h(0) = 2$ 를 만족해야하므로

$$h(x) = 2e^{\frac{3}{2}x}$$

라 하면 식 (6)이 성립하고, $h(x)$ 와 $h'(x)$ 를 식 (다)에 대입하여 $e^{3k} = \frac{5}{4}$ 를 얻고, 이

를 풀어 $k = \frac{1}{3} \ln \frac{5}{4}$ 를 얻는다. 이 때, $h(k) = \sqrt{5}$ 이다. 이 함수 $h(x) = 2e^{\frac{3}{2}x}$ 와 실수 $k = \frac{1}{3} \ln \frac{5}{4}$ 는 문제의 조건을 모두 만족시키므로 $h(k)$ 의 최댓값은 $\sqrt{5}$ 이다.